TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA

Azatioprina, Ciclofosfamida, Danazol, Imunoglobulina Humana

Eu,					(nc	me do(a	a) pacient	te),
declaro ter sic	do informado(a)	claramente	sobre	benefícios,	riscos,	contrair	ndicações	е
principais efeito	os adversos rela	icionados ao	uso d	e AZATIOP	RINA, (CICLOF	OSFAMI)Α,
	IA, DANAZOL e DMBOCITOPÊNI	_		A HUMANA	indicado	s para	o tratame	nto
Os termos mé	édicos foram exp	olicados e to	das as	dúvidas foi	am reso	olvidas į	pelo méd	ico
				(nome	do méd	ico que	prescreve)).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:

- cessação dos sangramentos ativos;
- prevenção da ocorrência de sangramentos importantes;
- aumento da contagem total de plaquetas.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso destes medicamentos:

- não se sabe ao certo os riscos do uso de ciclosporina e imunoglobulina humana na gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o médico;
- ciclofosfamida não deve ser usada durante a gestação pelo risco de má formação do feto;
- azatioprina apresenta risco para o feto durante a gravidez, porém o benefício pode ser maior do que o risco e isso deve ser discutido com o médico;
- danazol está contraindicado para gestantes ou mulheres planejando engravidar;
- efeitos adversos da azatioprina: diminuição das células brancas, vermelhas e plaquetas do sangue, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, fezes com sangue, problemas no fígado, febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de pele, queda de cabelo, aftas, dores nas juntas, problemas nos olhos (retinopatia), falta de ar, pressão baixa;
- efeitos adversos da ciclofosfamida: náuseas, vômitos, queda de cabelo, risco aumentado de infecções, anemia, toxicidade para medula óssea, infecções na bexiga, risco de sangramento (redução do número de plaquetas);
- efeitos adversos do danazol: distúrbios da menstruação, ganho de peso, calorões, inchaço, escurecimento da urina, cansaço, sono, espinhas, aumento da oleosidade do cabelo e da pele, náuseas, vômitos, alteração da voz;
- efeitos adversos da imunoglobulina humana: dor de cabeça, calafrios, febre, reações no local de aplicação da injeção (dor, coceira e vermelhidão); problemas renais (aumento de creatinina e ureia no sangue, seguido de oligúria e anúria, insuficiência renal aguda, necrose tubular aguda, nefropatia tubular proximal, nefrose osmótica);
- risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei ser atendido(a), inclusive em caso de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.

() ciclofosfamida								
() danazol								
() imunoglobulina humana								
Local: Data:								
Nome do paciente:								
Cartão Nacional de Saúde:								
Nome do responsável legal:								
Documento de identificação do responsável legal:								
Assinatura do paciente ou do re	esponsável legal							
Médico Responsável:	CRM:		UF:					
Assinatura e carimbo do médic	;o	Data:						

Meu tratamento constará do seguinte medicamento:

() azatioprina